



Febbre West Nile

Febbre del Nilo Occidentale

Comune di Torri di Quartesolo (VI) - Prot. n. 0011901 del 10-06-2019.

WEST NILE

La febbre West Nile, o febbre del Nilo Occidentale è causata dal virus **West-Nile**, oramai endemico nel nostro territorio, trasmesso con la puntura di **zanzare infette all'uomo** e agli animali, generalmente equini ed uccelli. Le **zanzare** appartengono al genere **Culex**, tra cui la zanzara comune *C. pipiens*.

Il serbatoio di infezione è stato identificato in oltre 70 specie di **uccelli**, soprattutto passeriformi e corvidi, dove il virus può persistere da alcuni giorni a qualche mese.

Consulta il tuo medico se presenti:




- febbre > 38,5 C
- dolori muscolari e alle articolazioni
- cefalea
- confusione
- eruzione cutanea

Se cerchi informazioni o hai dubbi su come proteggerti dalle zanzare contatta il

Dipartimento di Prevenzione
della tua Azienda ULSS

CICLO DI TRASMISSIONE DEL VIRUS WEST NILE



Ospite a "fondo cieco": Equidi

Uccelli

Ospite a "fondo cieco":
Uomo

Come posso proteggermi dal rischio di infezione da West-Nile?

La misura piu' efficace è quella di ridurre al minimo il rischio di essere punti da zanzare attraverso questi **4 comportamenti**

1



Indossa indumenti di colore chiaro dal crepuscolo all'alba, pantaloni lunghi e maniche lunghe

2




Usa repellenti cutanei per uso topico. Utilizza spray a base di piretro o altri insetticidi per uso domestico, oppure utilizzare diffusori di insetticida elettrici, areando bene i locali prima di soggiornarvi.

3



Se non provvisti di aria condizionata, soggiorna e dormi solo in ambienti provvisti di zanzariere alle porte e alle finestre; per aumentare l'efficacia tratta le zanzariere con repellenti.

4



Se possibile utilizza il condizionatore ad una temperatura leggermente inferiore di notte - le zanzare non amano le temperature fredde

- Utilizzare i repellenti con moderazione ed attenersi scrupolosamente alle norme indicate nei foglietti illustrativi

- Non utilizzare i repellenti sulle mucose o su regioni cutanee in presenza di lesioni e porre particolare attenzione al loro impiego sui bambini e donne in gravidanza e in allattamento.

Per ulteriori informazioni consulta il materiale e la brochure "Scelta e corretto utilizzo dei repellenti cutanei per zanzare" all'indirizzo:

<https://www.regione.veneto.it/web/sanita/igiene-e-sanita-pubblica>;